

Campagne grippe et pneumocoques

Une campagne de sensibilisation commence dès ce 15 septembre vers les personnes > 65 ans et les malades chroniques > 50 ans.

La campagne de sensibilisation grippe commencera à partir de la deuxième quinzaine d'octobre. L'accent sera de nouveau mis sur le parcours simplifié du patient rendu possible par la prescription du vaccin autorisée par le pharmacien. Ce droit a été prolongé par AR sans limite dans le temps et est donc ancré définitivement dans la réglementation santé de notre pays.

Voici les recommandations actuelles (en vigueur depuis 2020) :

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/WIDE/Vaccin_pneumocoques-Recommandations_actuelles.pdf

Baisses de prix au 01/10

Au 1^{er} octobre, le prix de 47 conditionnements de médicaments va diminuer.

Pour 7 d'entre eux la baisse dépasse les 100€.

[https://www.apb.be/APB_LIBRARY/WIDE/2022-10-01%20\(1\)%20-%20Baisse%20de%20prix%20officiuse%20-%20TOP%20100%20-%20valeur.pdf](https://www.apb.be/APB_LIBRARY/WIDE/2022-10-01%20(1)%20-%20Baisse%20de%20prix%20officiuse%20-%20TOP%20100%20-%20valeur.pdf)

Module prise de rendez-vous

Le module de prise de rendez-vous de l'APB (tests antigéniques, vaccination Covid, BUM ...) est désormais gratuit.

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/WIDE/Fiche-info_Module%20de%20prise%20de%20RDV_JULY-2022_FR.pdf

Vaccination Covid : campagne d'automne

Résumé du webinaire de ce mardi 06/09/2022

- Le prof. JM Dogné dresse un point de la situation actuelle et future :
 - Situation épidémiologique actuelle calme depuis cet été
 - Vague supplémentaire prévue en novembre par les modèles mathématiques
 - Explication sur les variants et sous-variants résultant de modifications de la protéine Spike (extrémité fixée au virus et tige permettant au virus d'entrer dans la cellule). Ces modifications procurent au virus un avantage sélectif
Les sous-variants circulant actuellement semblent avoir une forte capacité à échapper à la réponse immunitaire (échappement immunitaire) et sont dotés d'une grande contagiosité d'où la nécessité de hausser le niveau de protection des plus fragiles (système et mémoire immunitaire beaucoup moins robuste)
 - Écart de 3 à 4 mois entre deux vagues de variants. Difficulté à prévoir le variant suivant : comme pour la grippe, on vaccine avec des souches dont on ne sait pas si elles seront les bonnes dans quelques mois
 - Les groupes prioritaires pour la revaccination Covid sont exactement les mêmes que pour la grippe
- Ludovic Sablon, collaborateur à l'Aviq dresse le bilan de la phase pilote de vaccination en officine.
 - Un peu plus de 11000 vaccinations effectuées en officine en date du 28/08/2022
 - Retours très positifs des citoyens
 - Schéma logistique actuel = livraison par Médista. A venir : par les grossistes
 - Recrutement en continu des pharmacies pour arriver > 200 pharmacies en septembre
- Le webinaire se termine par une séance questions/réponses.

Pour voir le webinaire (plus ou moins 1h30), voici le lien :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%20%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZDY4OTk5ZjAtMDJiMS00NDMyLTlM2YtMDQyZjkzMmEzNTk1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522a2aada0

Vous souhaitez vacciner dans votre officine ?

Il faut compléter le formulaire :

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tOfPGWn6kkKSf3m6KrlrI5Qw1LY8X51Hk7IFmVZNQD1UN1hONFpVT0RCVUhMTkoyQVVRUjdHVk81Uy4u>

Matériel de campagne mis à disposition par l'AVIQ :

<https://www.jemevaccine.be/ressources/>

Préparation en officine : risques de confusion

L'AFMPS rapporte les cas d'une préparation magistrale effectuée avec de la L-arginine Hcl au lieu de L-arginine et d'une autre effectuée avec de la 4-aminopyridine (sclérose en plaques) au lieu de amidopyridine (antiinflammatoire, analgésique).

Parmi les pistes évoquées par l'AFMPS pour éviter ces confusions aux conséquences souvent très importantes :

- Apposer des **signes distinctifs** sur les matières premières dangereuses à risque de confusion
- Principe des quatre yeux : **vérification de la préparation par une seconde personne**

https://www.apb.be/APB_LIBRARY/WIDE/07092022_Pr%C3%A9parations_officine_FR.pdf

Programme qualité préparations

L'APB vous permet de contrôler vos préparations magistrales. Ce service est gratuit et vous permet de prouver que vous délivrez des préparations de qualité.

Deux cycles sont actuellement ouverts :

- Émulsion à 10% de benzyle benzoate
- Suppos à 100mg de caféine

Pour vous inscrire :

<https://myqc.apb.be/nl-BE>

En direct de la tarification

Il est indispensable d'imprimer une DD (délivrance différée) lorsqu'elle a été produite à partir d'une ordonnance électronique.

Dans le cas d'un problème de traitement d'une ordonnance électronique pour l'O2, le RID doit absolument être scanné afin que l'ordonnance soit traitée par la tarification (pas d'encodage manuel possible par la tarification). Il est possible d'encoder une compresse Mélolin, par exemple que la tarification corrigera.

Lu pour vous

Prendre les antihypertenseurs le soir ou le matin ?

L'étude Time conclut qu'il n'y a pas de différence en termes d'efficacité selon que l'antihypertenseur est pris le matin ou le soir.

« On peut dire aux patients de prendre leurs antihypertenseurs quand ils le veulent ».

Néanmoins, par expérience, il vaut mieux conseiller au patient de prendre l'hypertenseur le matin car la routine du matin est souvent bien rôdée et moins propice aux oublis.

(Médiquality 05/09/2022)

Effets du vaccin antipneumococcique sur la mortalité et les résultats cardiovasculaires

Les infections à pneumocoques chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires sont associées à une morbidité et une mortalité accrue.

Il est prouvé que la vaccination antipneumococcique est cardioprotectrice.

(Médiquality 30/08/2022)

Je reste à votre entière disposition.

H.Lambion

