

1^{er} décembre 2016 : Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Autotest fiable pour la détection d'une infection au HIV datant de 3 mois et plus.

<u>Dispositif médical uniquement disponible</u> <u>en pharmacie</u>



Démarche à suivre :

Si le comportement à risque date de :

- 24 à 72 h: renvoyer le patient vers l'hôpital ou les Urgences (possibilité éventuelle d'une prophylaxie de post exposition T.P.E*)
- Au-delà de 72 h : détection après 6 semaine via un centre de dépistage.
- A partir de 3 mois : auto test HIV disponible uniquement en pharmacie.

Notice d'utilisation:

https://www.webphar.net/information/appl/notice%20auto%20test%20hiv%20nov%202016.pdf

Questionnaire et centres de dépistage et d'aide psycho sociale et morale aux patients HIV :

https://www.webphar.net/information/appl/Questionnaire%20et%20centres%20soutien%20et%20aide%20psychologique%20HIV.pdf

*TPE: prophylaxie ou traitement de post exposition.

TRUVADA®: Remboursable avec autorisation type « d » et « b » au 1^{er} décembre 2016 (CNK: 2578367)

<u>Délivrable sur prescription, remboursable</u>

(durée limitée type b et durée illimité type d) Prix : PP € 527,36



TRUVADA ® est une combinaison de deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (Emtricitabine VIH-1 et Tenofovir VIH-2).

Au 1^{er} décembre,

- Les critères d'autorisations de remboursement de bons nombres d'antirétroviraux devraient être plus larges (admis quel que soit le taux de lymphocytes CD4+).
- Beaucoup d'antirétroviraux diminuent de prix.

 Total a l'action de l'acti

Le Truvada® est concerné.

Le Truvada® peut aussi être prescrit à des patients séronégatifs à risques élevés dans le cadre de la <u>Prophylaxie de pré exposition : PrEP)</u>.

La PrEP est un moyen de prévention qui consiste à utiliser des agents anti-rétroviraux afin de réduire la probabilité d'une infection par le HIV chez des patients séronégatifs. Utilisé en prévention, ce type de produit (truvada®) permettrait de réduire de 84 % les risques d'infection HIV si la compliance au traitement est respectée https://www.be-prep-ared.be/fr/prep-info-fr/

« Ce médicament préventif a sa place mais il semblerait logique d'un point de vue santé publique de traiter tous les patients diagnostiqués et de recommander le port du préservatif, qui protégera aussi contre les autres MST ».

La Prophylaxie de <u>pré</u> - exposition n'est pas remboursée en Belgique¹

La prophylaxie <u>post</u>- exposition, est quant à elle remboursable en Belgique.