

Chers Membres,

Dès la mi-novembre, un auto test HIV sera disponible en pharmacie. CNK : 3415973

En tant que pharmacien, nous avons un rôle de **conseiller, d'orientation** (gestion des plaintes de santé) et de **prévention** dans le cadre de la Santé Publique.

Exclusif en pharmacie



3415-973
PP € 29,90

- Dépistage à partir d'une goutte de sang
- Simple d'utilisation
- Résultat en 15 minutes
- Notice détaillée avec images à l'appui et points de contact
- Dispositif médical avec label CE

Cet autotest est fiable pour détecter une infection au HIV datant de 3 mois et plus*.

Public cible ?

- Patient qui a eu un comportement à risque **il y a trois mois ou plus**, et/ou personnes à comportements à risque continu
- Couple formé depuis 3 mois
- Projet de grossesse, première prescription d'une contraception,
- Suspicion ou diagnostic d'hépatite B ou C,
- Suspicion ou diagnostic de tuberculose,
- En cas de signes évocateurs d'une infection par le VIH,

Notice d'utilisation : <https://www.webphar.net/information/appl/notice%20auto%20test%20hiv%20nov%202016.pdf>

*La délivrance de ce test n'apportera un résultat fiable que si le ou les comportements à risque à prendre en compte remontent à 3 mois ou plus.

- Le test n'offrira *aucun résultat appréciable* pour tous comportements à risque **datant de 24 à 72h**.
- Tous patients ayant eu de réels comportements à risques remontant à **moins de 72 h** doivent être *renvoyés rapidement vers les urgences*. (TPE : traitement de post exposition).
- Si la relation à risque date de **plus de 6 semaines**, orienter le patient vers un *dépistage classique* des centres anti Sida

<https://www.youtube.com/watch?v=zJjOCZF6Kkg> ATTENTION l'adaptation du N° tel pour la Belgique sera faite pour mi-novembre.

En fonction du résultat du test, essayer dans la mesure du possible d'apporter un encadrement ou un soutien médico-psychologique pour votre patient. (Le diriger vers généraliste, des centres référence sida,....)

Conseils à votre patientèle :

- Suivi médical lors de relations non protégées
- Port du préservatif lors de relations de « rencontre » et au minimum au moins six semaines après la prise de risque (respect du partenaire).
- Dépistage aussi des autres MST (syphilis, ...) dont la prévalence augmente
- Contraception adéquate
- Informer sur : **Centres de dépistage « anonymes » et gratuits, Centres de référence SIDA, Centres de planning familiaux, Associations de prévention VIH/sida,....**